



VP-PHARM
Health & Future



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM

Trụ sở: Số 213 Lô C5, KĐT Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Lô B1.2 -LK 4-12 - KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội
Điện thoại : 0975.498.284 * Email: lienhe@vppharm.vn * Website: <http://vppharm.vn>

Kính gửi Quý Khách hàng!

Lời đầu tiên, VP-PHARM xin gửi đến Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

VP-PHARM xuất hiện trên thị trường dược phẩm Việt Nam mang đậm phong cách người Việt trẻ, dám nghĩ, dám làm và luôn luôn gắn cả sứ mệnh của mình với từng viên thuốc được sản xuất ra.

Công ty Cổ phần Dược VP-PHARM định hướng phát triển theo tiêu chuẩn riêng của mình. Quyết tâm trau chuốt tốt từ bên trong đến bao bì ngoài của sản phẩm. Chúng tôi cam kết mang đến cho người sử dụng những sản phẩm thuốc chất lượng cao, hiệu quả điều trị tốt với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

VP-PHARM đầu tư cho đội ngũ nghiên cứu sản xuất là các Dược sỹ trẻ, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản cùng với việc xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đáp ứng những tiêu chuẩn ngặt nghèo nhất của ngành dược phẩm yêu cầu.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý Khách hàng để cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp lâu dài bền vững.

Với triết lý luôn coi Khách hàng là người bạn đồng hành, chúng tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng mọi cam kết, thực hiện có trách nhiệm để thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên một cách trọn vẹn.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên VP-PHARM

Trân trọng!

Tổng giám đốc

Bùi Quang Cung



THUỐC HO

CHẤM DỨT

Ho khan

Ho dai dẳng

Đặc biệt ho đêm

CARSAKID

- CÔNG THỨC ĐỘT PHÁ

- DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG



Thành phần:

- Carbocistein 20mg/ml
- Promethazine HCL 0,5mg/ml

Chỉ định:

- Ho khan
- Ho dai dẳng, đặc biệt HO ĐÊM

Liều dùng

- Trẻ em từ 2 -2,5 tuổi:
Ngày 3 lần, lần 1 ống.
- Trẻ em từ 2,5 tuổi trở lên:
Ngày 3 -4 lần, lần 1 ống.
- Người lớn: ngày 4 lần, lần 1 ống



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM
Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

VIÊN NGẬM ĐAU HỌNG

ANZ

Bromelain / Chamomile / Menthol / Eucalyptol

HỖ TRỢ GIÚP:

- **GIẢM SỪNG ĐAU HỌNG**
- **MÁT HỌNG, GIẢM HO**



DÙNG CHO NGƯỜI BỊ:

- Viêm họng, đau rát họng, khản tiếng
- Ho khan, ho do cảm lạnh



■ THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Cho 1 viên

Chamomile (Cúc la mã)	500 mg
Bromelain	10 mg
Menthol	5 mg
Eucalyptol.....	5 mg

Phụ liệu: tá dược vừa đủ 1 viên.

■ **CÔNG DỤNG:** Hỗ trợ giúp mát họng, giảm ho, giảm sưng đau họng.

■ ĐỐI TƯỢNG DÙNG:

- Người bị viêm họng, đau rát họng, khản tiếng.
- Người bị ho khan, ho do cảm lạnh.

■ CÁCH DÙNG:

- Ngậm 1 viên/lần, ngày 3 - 4 lần.
- Trường hợp nặng có thể ngậm 5 - 6 lần.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn chính của sản phẩm.

■ **QUY CÁCH:** Hộp 25 vỉ x 8 viên.

■ **SỐ ĐKSP: 5077/2018/ĐKSP**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
 Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TỰ Y TẾ HÀ NAM
 Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

THUỐC VIÊN NÉN AMBROXOL



Ambroxol Hydroclorid.....30mg

- **TIÊU TÁN DỊCH NHẢY**
- **GIẢM HO**
- **DỪNG CẮT LIỀU PHỐI HỢP THUỐC**



Hộp 10 vỉ* 10 viên

THUỐC DỪNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP:

- ✓ Các bệnh cấp và mạn tính đường hô hấp kèm tăng tiết dịch phế quản
- ✓ Đợt cấp của viêm phế quản mạn
- ✓ Hen phế quản
Viêm phế quản dạng hen

THÀNH PHẦN:

Ambroxol hydroclorid.....30mg
Tá dược khác

CHỈ ĐỊNH:

Tiêu nhầy đường hô hấp, dùng trong các trường hợp:
- Bệnh cấp và mạn tính đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản, viêm phế quản dạng hen.

LIỀU DÙNG:

- Trẻ 6- 12 tuổi: 1/2 viên/ lần. 2-3 lần/ ngày
- Người lớn và thanh thiếu niên trên 12 tuổi:
 - + Uống 1 viên/ lần. 3 lần/ ngày
 - + Sau đó uống 1 viên/ lần. 2 lần/ ngày

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc kĩ trong tờ hướng dẫn sử dụng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
Sản xuất tại: Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HÀ NAM**
Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

Ambroxol Hydroclorid.....20mg



**Giảm ho, giảm đau
rất họng**



Tiêu dịch nhầy



Hộp 2 vỉ* 8 viên ngậm

Dùng cho người bị:

- ▶ **Ho tiết nhiều đờm**
- ▶ **Viêm họng, đau rất họng**



THÀNH PHẦN:

Ambroxol hydroclorid.....20mg

Tá dược khác: Đường kính, Mannitol, Sucralose, Menthol, Macrogol 600, talc.

CHỈ ĐỊNH:

Tiêu dịch nhầy, giảm ho, giảm đau rất họng.

LIỀU DÙNG:

- Người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi: Ngậm 1 viên/ lần, tối đa 6 lần/ ngày
- Trẻ em dưới 12 tuổi: Không khuyến cáo

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc kĩ trong tờ hướng dẫn sử dụng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
Sản xuất tại: Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HÀ NAM**
Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài


Thuốc điều trị các bệnh ngoài da

Lifedovate[®] Cream

Clobetasone butyrate 5,0mg



ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ Ở DA



▶ **THUỐC BÔI ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NGOÀI DA**

▶ **TRỊ CHÀM TRẺ EM & CÁC BỆNH ECZEMA**

■ **THÀNH PHẦN:** trong 10 g kem chứa:

Clobetasone butyrate 5,0mg.

Tá dược vừa đủ 10g.

■ **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các bệnh lý ở da như: Chàm, viêm da do tiếp xúc, viêm da dị ứng, viêm da có tróc vảy, hăm da, sẩn, bệnh vẩy nến, ngứa, viêm da do tiếp xúc ánh sáng mặt trời, phản ứng da do côn trùng đốt.

■ **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Bôi một lớp thuốc mỏng lên vùng da bị bệnh, 4 lần/ngày.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Không dùng cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Nhiễm trùng da tiên phát do virus. Không được dùng điều trị những tổn thương da do nhiễm trùng tiên phát bởi nhiễm nấm hoặc vi khuẩn. Không được bôi thuốc lên vùng da bị trầy xước, da bị tổn thương diện rộng.

■ **CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem trong tờ HDSĐ

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

■ **SỐ ĐKSP:** VD-34632-20



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài


* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Purebac

Nano bạc, Kẽm oxid, Chiết xuất lá xoài
xuất lá xoài

NANO SILVER
&
Natural herbs



ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG

DÙNG ĐƯỢC CHO MỌI LỨA TUỔI



Chân tay miệng




Zona, gời leo, herpes



Mụn nhọt, tẩy, chốc lở



Muỗi, côn trùng đốt



Thủy đậu



Vết bỏng

■ **THÀNH PHẦN:** Nano bạc, kẽm Oxit, chiết xuất lá xoài, chiết xuất lá đơn đỏ, chamomile, nước tinh khiết.

■ **CÔNG DỤNG:** Giúp làm sạch da, kháng khuẩn, bảo vệ và chăm sóc da khi bị thủy đậu, zona, viêm da, chân tay miệng, herpes, bỏng, rôm sảy, mụn nhọt, sưng tấy, muỗi đốt,... góp phần kích thích tái tạo tế bào da mới.

■ **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Bôi một lớp mỏng kem Pure Bạc lên các vết da bị thủy đậu hoặc các vùng da cần bôi ngày 3 đến 4 lần.

■ **ĐỐI TƯỢNG DÙNG:**

Trẻ em và người lớn khi bị thủy đậu, zona,

viêm da, chân tay miệng, herpes, bỏng, rôm sảy, mụn nhọt, sưng tấy, muỗi đốt,...

Số ĐK: 01/21/CBMP-HT

Để xa tâm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Thiết bị y tế loại A



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

* Email: lienhe@vp-pharm.vn

* Website: <http://vp-pharm.vn>

THUỐC HẠ SỐT GIẢM ĐAU

VIÊN NÉN SỦI BỌT



BUFECOL

Ibuprofen 400mg



Sinh khả dụng cao

Tác dụng nhanh

Giảm đau tức thì, mạnh

IBUPROFEN sủi
đầu tiên tại Việt Nam

- ▶ Nhức đầu / Đau cơ
- ▶ Đau bụng kinh
- ▶ Đau răng / Sốt
- ▶ Viêm khớp dạng thấp

◉ GIẢM ĐAU ◉ HẠ SỐT

■ **CÔNG THỨC:**

- + Mỗi viên chứa
 - Ibuprofen 400 mg.
 - Tá dược vừa đủ 1 viên.

■ **CHỈ ĐỊNH:**

- **Ha sốt:**
- **Giảm đau:** đau đầu, đau tai, đau răng, đau lưng, đau dây chằng, cơ bắp, đau do viêm khớp dạng thấp và các trường hợp đau nhẹ và vừa khác.
- **Chống viêm:** viêm khớp dạng thấp

■ **LIỀU DÙNG:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, mỗi lần 1 viên, lặp lại mỗi 4 đến 6 tiếng. Ngày không quá 3 viên.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem tờ HSDS

■ **THẬN TRỌNG:** Xem kỹ tờ HSDS.

■ **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

- Xem kỹ tờ HSDS.

■ **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:** Xem HSDS

■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

- Xem HSDS

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ.

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. *Để xa tầm tay trẻ em.*

■ **TIÊU CHUẨN:** TCCS

■ **SDK:** VD-32565-19



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM
Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài.

THUỐC HẠ SỐT GIẢM ĐAU

VIÊN NÉN SỬ BỌT **BUFECOL 200**

Ibuprofen 200mg



DÀNH CHO TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 15 TUỔI

**Sinh khả dụng cao
Tác dụng nhanh
Giảm đau tức thì, mạnh
IBUPROFEN sử
đầu tiên tại Việt Nam**

- ▶ Nhức đầu / Đau cơ
- ▶ Đau bụng kinh
- ▶ Đau răng / Sốt

◊ GIẢM ĐAU ◊ HẠ SỐT

■ **CÔNG THỨC:**

- + Mỗi viên chứa
- Ibuprofen 200 mg.
- Tá dược vừa đủ 1 viên.

■ **CHỈ ĐỊNH:**

- **Hạ sốt:**
- **Giảm đau:** đau đầu, đau tai, đau răng, đau lưng, đau dây chằng, cơ bắp, đau do viêm khớp dạng thấp và các trường hợp đau nhẹ và vừa khác.
- **Chống viêm:** viêm khớp dạng thấp

■ **LIỀU DÙNG:**

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, mỗi lần 1 viên, lặp lại mỗi 4 đến 6 tiếng.
Ngày không quá 3 viên.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem tờ HDSD

■ **THẬN TRỌNG:** Xem kỹ tờ HDSD.

■ **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

- Xem kỹ tờ HDSD.

■ **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:** Xem HDSD

■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

- Xem HDSD

*Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ.*

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.

■ **TIÊU CHUẨN:** TCCS

■ **SDK:** VD-32564-19



VP-PHARM
Health & Future

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HÀ NAM

Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

Tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài.

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: http://vppharm.vn

BUFECOL

Ibuprofen 100 mg

SỐT

ĐAU HỌNG

ĐAU RĂNG



HỘP 24 GÓI

■ CÔNG THỨC:

- + Mỗi gói chứa
- Ibuprofen 100 mg.
- Tá dược vừa đủ 3g.

■ CHỈ ĐỊNH:

- **Hạ sốt:** cảm lạnh, cảm cúm, sốt sau tiêm chủng,...
- **Giảm đau:** đau đầu, đau tai, đau răng, đau lưng, đau dây chằng, cơ bắp, đau do viêm khớp dạng thấp và các trường hợp đau nhẹ và vừa khác.

- **Chống viêm:** viêm khớp dạng thấp

■ LIỀU DÙNG:

- Hạ sốt:

Trẻ 3-6 tháng tuổi: có trọng lượng cơ thể trên 5 kg: Liều 50 mg ibuprofen/ lần, ngày 3 lần.

Trẻ 6 tháng- 1 năm: Liều 50 mg Ibuprofen/ lần, ngày 3-4 lần

Trẻ em từ 1-3 tuổi: 100 mg /lần, ngày 3 lần

Trẻ em từ 4-6 tuổi: 150 mg / lần, ngày 3 lần

Trẻ em từ 7-9 tuổi: 200 mg / lần, ngày 3 lần

Trẻ em từ 10-11 tuổi: 300 mg / lần, ngày 3 lần

Trẻ em, người lớn trên 12 tuổi: 200-400 mg / lần, có thể dùng đến

3 lần/ ngày. Khoảng cách giữa các liều tối thiểu là 4 giờ, không dùng quá 1200 mg trong vòng 24 giờ.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem tờ HDSD

■ **THẬN TRỌNG:** Xem kỹ tờ HDSD.

■ **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

- Xem kỹ tờ HDSD.

■ **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:** Xem HDSD

■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

- Xem HDSD

*Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ.*

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. *Đề xa tầm tay trẻ em.*

■ **TIÊU CHUẨN:** TCCS

■ **SDK:** VD-32561-19



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TỰ Y TẾ HÀ NAM**

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài.

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

THUỐC HẠ SỐT GIẢM ĐAU

BUFECOL

Ibuprofen 100mg

Chai 60ml



◉ GIẢM ĐAU ◉ HẠ SỐT

■ CÔNG THỨC:

- + Mỗi 5ml chứa
 - Ibuprofen 100 mg.
 - Tá dược vừa đủ 5ml.

■ CHỈ ĐỊNH:

- **Hạ sốt:** cảm lạnh, cảm cúm, sốt sau tiêm chủng...
- **Giảm đau:** đau đầu, đau tai, đau răng, đau lưng, đau dây chằng, cơ bắp, đau do viêm khớp dạng thấp và các trường hợp đau nhẹ và vừa khác.
- **Chống viêm:** viêm khớp dạng thấp

■ LIỀU DÙNG:

- **Hạ sốt:**
 - Trẻ 3-6 tháng tuổi: có trọng lượng cơ thể trên 5 kg: Liều 50 mg (2,5 ml) ibuprofen/ lần, ngày 3 lần.
 - Trẻ 6 tháng - 1 năm: Liều 50 mg (2,5 ml) Ibuprofen/ lần, ngày 3-4 lần
 - Trẻ em từ 1-3 tuổi: 100 mg (5 ml) /lần, ngày 3 lần
 - Trẻ em từ 4-6 tuổi: 150 mg (7,5 ml) / lần, ngày 3 lần
 - Trẻ em từ 7-9 tuổi: 200 mg (10 ml) / lần, ngày 3 lần
 - Trẻ em từ 10-11 tuổi: 300 mg (15 ml)/ lần, ngày 3 lần

Trẻ em, người lớn trên 12 tuổi: 200-400 mg (10-20 ml) / lần, có thể dùng đến 3 lần/ ngày. Khoảng cách giữa các liều tối thiểu là 4 giờ, không dùng quá 1200 mg trong vòng 24 giờ.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem tờ HDSD

■ **THẬN TRỌNG:** Xem kỹ tờ HDSD.

■ **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

- Xem kỹ tờ HDSD.

■ **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:** Xem HDSD

■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

- Xem HDSD

*Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ.*

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. *Đưa xa tầm tay trẻ em.*

■ **TIÊU CHUẨN:** TCCS

■ **SDK:** VD-32562-19



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM
Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

Tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài.

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

THUỐC ĐIỀU TRỊ HO

HABROXOL

Ambroxol hydroclorid.....15mg/5ml

100 ml



CHỈ ĐỊNH DÙNG CHO TRẺ TỪ 2 TUỔI



MÙI VỊ NGON, DỄ UỐNG



Nguyên liệu châu Âu đảm bảo sinh khả dụng cao cho thuốc.



TIÊU TÁN CHẤT NHẪY



GIẢM HO



■ CÔNG THỨC:

- + **Dạng chai siro:** cho 5ml thành phẩm
- Ambroxol hydroclorid.....15mg.
- Tá dược vừa đủ 5ml.

■ CHỈ ĐỊNH: Từ 2 tuổi trở lên:

Thuốc tiêu chất nhầy đường hô hấp, dùng trong các trường hợp:

- Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản, viêm phế quản dạng hen.
- Các bệnh nhân sau mổ và cấp cứu để phòng các biến chứng ở phổi.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người bệnh đã biết quá mẫn với ambroxol.
- Loét dạ dày tá tràng tiến triển.

■ **THẬN TRỌNG:** Cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra máu vì ambroxol có thể làm tan các cục đông fibrin và làm xuất huyết trở lại.

■ SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- **Thời kỳ mang thai:** chưa có tài liệu nói đến tác dụng xấu khi dùng thuốc trong lúc mang thai, dù sao cũng cần thận trọng khi dùng thuốc này trong 3 tháng đầu của thai kỳ.
- **Thời kỳ cho con bú:** chưa có thông tin về nồng độ của

bromhexin cũng như ambroxol trong sữa.

■ **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:** Chưa có triệu chứng quá liều trên người. Nếu xảy ra, cần điều trị triệu chứng.

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Tiêu hóa: Tai biến nhẹ, chủ yếu sau khi tiêm như ợ nóng, khó tiêu, đôi khi buồn nôn, nôn.
- Dị ứng: Chủ yếu phát ban.
- Phản ứng kiểu phản vệ cấp tính, nặng, nhưng chưa chắc chắn là có liên quan đến ambroxol, miệng khô, và tăng các transaminase.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

■ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ.

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. *Để xa tầm tay trẻ em.*

■ **SDK sản phẩm chai siro:** VD-32991-19



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Tài liệu này chỉ dùng để trao đổi nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài.

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

THUỐC ĐIỀU TRỊ THIẾU KẸM

SNAPCEF

Kẽm Gluconate 56mg



PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC TRƯỜNG HỢP THIẾU KẸM

■ CÔNG THỨC BẢO CHẾ: Mỗi 5ml thành phần chứa:

Kẽm Gluconate 56mg (tương ứng Kẽm 8mg)

Tá dược vừa đủ 5ml.

■ CHỈ ĐỊNH:

- Uống kết hợp với các dung dịch bù nước và điện giải trong phác đồ điều trị tiêu chảy kéo dài (theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO).

- Bổ sung Kẽm vào chế độ ăn hàng ngày, tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể khỏe mạnh.

- Phòng ngừa và điều trị các trường hợp thiếu Kẽm: Trẻ còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng, thường bị rối loạn tiêu hóa, chán ăn, khó ngủ, khò khè đêm, nhiễm trùng tái diễn ở da, đường hô hấp, đường tiêu hóa, khô da, da đầu chỉ dày sừng, hói, loạn dưỡng móng (móng nhàn, có vệt trắng, chậm mọc), vết thương chậm lành, khô mắt, loét giác mạc, quáng gà.

- Phụ nữ mang thai (thường bị nôn) và bà mẹ đang cho con bú, người có chế độ ăn thiếu cân bằng hoặc ăn kiêng, người phải nuôi ăn lâu dài qua đường tĩnh mạch.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

■ **THẬN TRỌNG:** Thận trọng khi dùng siro Kẽm trong giai đoạn loét dạ dày tá tràng tiến triển và nôn ói cấp tính.

■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Cảm giác khó chịu ở dạ dày có thể xảy ra nhưng hiếm và giảm dần sau vài ngày dùng thuốc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn

gặp phải khi sử dụng thuốc.

■ **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:** Uống sau bữa ăn.

- **Bổ sung Kẽm, phòng ngừa và điều trị các trường hợp thiếu Kẽm:** Trẻ còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng..., phụ nữ mang thai (thường bị nôn) và bà mẹ đang cho con bú, người có chế độ ăn thiếu cân bằng hoặc ăn kiêng... Dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng.

+ Trẻ em dưới sáu tuổi: Dùng 2-3ml siro/ngày.

+ Trẻ trên 6 tuổi và người lớn: Dùng 5ml siro/ngày.

- **Uống kết hợp với các dung dịch bù nước và điện giải trong phác đồ điều trị tiêu chảy kéo dài:** Dùng liên tục trong 14 ngày.

+ Trẻ em dưới sáu tháng tuổi: Dùng 5ml siro/ngày.

+ Trẻ trên sáu tháng tuổi và trẻ lớn: Dùng 10ml siro/ngày. Hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

■ **QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Bổ sung Kẽm liều cao dài ngày có thể gây thiếu hụt đồng, thiếu máu, giảm bạch cầu. Nồng độ Kẽm trong huyết thanh có thể giảm bằng cách sử dụng một loại thuốc chelating như sodium calcium edetate.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

■ **SỐ ĐKSP:** VD-21199-14



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

THUỐC KHÁNG SINH TRẺ EM

ERYKID

Erythromycin Etylsuccinate...250 mg

Chai 100ml



- ▶ Nguyên liệu Châu Âu
- ▶ Mùi vị ngon, không đắng
- ▶ Sinh khả dụng cao hơn dòng Erythrocylin dạng muối Stearat

■ CÔNG THỨC:

+ Mỗi 5ml chứa

- Erythromycin succinate.....250mg.
- Tá dược vừa đủ 5ml.

■ CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm họng, viêm amidal, viêm phổi, viêm bạch hầu, viên đường hô hấp trên cho trẻ em do vi khuẩn nhạy cảm.
- Dùng thay thế khi bị dị ứng các kháng sinh Beta-lactam.

■ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em: uống 30– 50mg/kg thể trọng/ngày, chia 2– 3 lần.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Viêm gan.
- Rối loạn Porphyrin.

■ **THẬN TRỌNG:** Giảm liều đối với bệnh nhân suy giảm chức năng gan.

■ SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Thời kỳ mang thai: Không sử dụng.
- Thời kỳ cho con bú: chưa có thông tin về nồng độ của thuốc trong sữa.

■ **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:** Quá liều Erythromycin thường có triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, mất thính lực (tạm thời).

- Cách xử trí: cho dùng epinephrin, corticosteroid và thuốc kháng histamin để xử trí các phản ứng dị ứng; thực rửa dạ dày để loại trừ thuốc chưa hấp thu ra khỏi cơ thể; và khi cần dùng các biện pháp hỗ trợ.

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, để nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thường gặp: đau bụng, nôn, tiêu chảy, ngoại ban, ...
 - Ít gặp: mày đay.
 - Hiếm gặp: loạn nhịp tim, tăng transaminase, tăng bilirubin huyết, điếc có hồi phục.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

*Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ.*

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. *Để xa tầm tay trẻ em.*

■ **SDK:** VD-32990-19



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối,

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: http://vppharm.vn

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM


Điện thoại đặt hàng: 0975 498 284

Tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

MEN ỔNG

Enterobioplus



NGUỒN VI KHUẨN CHUẨN NUÔI CẤY TỪ HÀNG PHÁP

CAM KẾT HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG

MẪU ỔNG TRÒN ĐÁY BẰNG ĐẸP - HẤP DẪN

- + CÓ 5MG KẼM GIÚP TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG VÀ CHỐNG TIÊU CHẢY TUYỆT VỜI
- + 100 TRIỆU VÁCH TẾ BÀO VI KHUẨN GIÚP HỆ TIÊU HÓA NHẬN BIẾT VI KHUẨN CÓ HẠI NHANH HƠN



■ THÀNH PHẦN: Trong 10ml gồm có:

Bacillus clausii	2 x 10 ⁹ CFU
Bacillus subtilis	10 ⁹ CFU
Kẽm gluconate	5mg
Vách tế bào vi khuẩn Lactobacillus fermentum	0,6mg

Phụ liệu: Nước cất tinh khiết vừa đủ.

■ CÔNG DỤNG:

• Hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn, giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột.

■ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

• Người bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc do dùng kháng sinh dài ngày với các triệu chứng: Đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, đi ngoài phân sống, táo bón.

■ CÁCH DÙNG:

• Trẻ trên 6 tuổi và người lớn: Uống 1 ống/lần x 3 lần/ngày.

- Trẻ từ 1 - 6 tuổi: Uống 1 ống/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ dưới 1 tuổi: Tham khảo ý kiến bác sĩ, được si trước khi dùng (liều tham khảo: Uống 1 ống/lần x 1 lần/ngày).

Lưu ý: Có thể nhìn thấy các hạt nhỏ trong ống do sự tập hợp các bào tử lợi khuẩn Bacillus. Điều đó chỉ ra sản phẩm không bị thay đổi chất lượng. Lắc đều trước khi sử dụng.

■ THỜI HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.

■ TIÊU CHUẨN: TCCS

■ BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em. Nhiệt độ dưới 30C

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

■ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 14 ống x 10ml.



VP-PHARM
Health & Future

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND**

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

THUỐC BISEPTOL GÓI TRẺ EM

PENSTAL

Trimethoprim
Sulfamethoxazol

40mg
200mg

KHÁNG SINH KINH ĐIỂN ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY



HỘP 24 gói

■ CÔNG THỨC:

- + Mỗi gói chứa
- Trimethoprim 40mg
- Sulfamethoxazol 200mg

■ CHỈ ĐỊNH:

- Nhiễm khuẩn tiêu hóa do ly trực khuẩn, thương hàn
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu do các vi khuẩn nhạy cảm

■ LIỀU DÙNG:

- Trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên
- 8mg Trimethoprim+40mg Sulfamethoxazol/Kg thể trọng

■ CÁCH DÙNG:

- Cắt góc gói thuốc, cho vào chén sạch, hòa một lượng nước sạch dùng để uống vừa phải, khuấy tan và cho trẻ uống ngay sau khi pha.

■ **THẬN TRỌNG:** Xem kỹ tờ HDSĐ.

■ BẢO QUẢN:

- Nơi khô mát, tránh ánh nắng.

■ **TIÊU CHUẨN:** TCCS

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Suy thận nặng mà không giám sát được nồng độ thuốc trong huyết tương.
- Người bệnh được xác định thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu acid folic.
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ dưới 2 tháng tuổi

■ ĐÓNG GÓI:

- Hộp 24 gói bột.

*Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ.*

■ **HẠN DÙNG:** Xem trên bao bì.

■ **SDK:** VD-22271-15



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

* Email: lienhe@vp-pharm.vn

* Website: <http://vp-pharm.vn>

Điện thoại đặt hàng: 0975 498 284

Tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài.

THUỐC BISEPTOL SI RÔ

TRIMACKIT

Trimethoprim
Sulfamethoxazol

40mg
200mg



HỘP 1 CHAI 50ML

NHIỄM KHUẨN TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU, VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP

■ CÔNG THỨC:

- Trimethoprim 40mg
- Sulfamethoxazol 200mg

■ CHỈ ĐỊNH:

- Nhiễm khuẩn tiêu hóa do trực khuẩn, thương hàn
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu do các vi khuẩn nhạy cảm

■ LIỀU DÙNG:

- Trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên
- 8mg Trimethoprim+40mg Sulfamethoxazol/Kg thể trọng

■ CÁCH DÙNG:

- Uống trực tiếp theo liều dùng

■ THẬN TRỌNG:

Xem kỹ tờ HDSD.

■ BẢO QUẢN:

- Nơi khô mát, tránh ánh nắng.

■ TIÊU CHUẨN:

TCCS

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Suy thận nặng mà không giám sát được nồng độ thuốc trong huyết tương.

- Người bệnh được xác định thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu acid folic.
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ dưới 2 tháng tuổi

■ ĐÓNG GÓI:

- Hộp 1 lọ 50ml.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ.

■ HẠN DÙNG:

Xem trên bao bì.

■ SĐK: VD-19809-13



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

Tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài.

* Email: lienhe@vp-pharm.vn

* Website: <http://vp-pharm.vn>

BÀI THUỐC KINH ĐIỂN

HẾT ĐAU RĂNG NGAY TỨC THÌ

CÓ SẴN BÔNG THẮM

VÒI HÚT TIỆN LỢI

SỬ DỤNG AN TOÀN



Daratex

CHUYÊN SÂU RĂNG



■ **THÀNH PHẦN:** Chiết xuất hỗn hợp từ bài thuốc kinh điển gồm:

Đại Hối, Xuyên Khung, Thương Truật, Hoàng Bá, Đương Quy, Phòng Phong, Tế Tân, Bạch Chỉ, Đinh Hương, Thăng Ma, Tào Giác, Huyết Giác, Bạch Phàn, Long Nào, Menthol.

■ **CÔNG DỤNG:** Dung dịch dùng bôi răng lợi và miệng; Giúp: làm sạch răng lợi và miệng, làm dịu mát miệng khi bị: sâu răng, viêm nướu, viêm lợi, viêm quanh răng. Góp phần ngăn ngừa vi khuẩn gây: sâu răng, viêm lợi....., bảo vệ răng chắc khỏe

■ **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Dùng cục bông tiết trùng có sẵn trong hộp. Trẻ em từ 5-12 tuổi: nhỏ 1 đến 2 giọt, trẻ em trên 12 tuổi và người lớn nhỏ 3-5 giọt Daratex vào bông sau đó đặt lên vùng bị sâu răng, viêm nướu, viêm lợi, viêm chân răng, giữ chặt từ 30 giây đến 1 phút. Ngày dùng 3 đến 6 lần tùy mức độ đau nhức.

■ **ĐỐI TƯỢNG DÙNG:**

- Người lớn và trẻ em trên 5 tuổi bị sâu răng, viêm nướu, viêm lợi, viêm chân răng gây đau và nhức buốt khó chịu.

Đề xa tâm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM IVYPHARMA

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

Sản phẩm đăng kí mỹ phẩm

Dùng dịch dùng ngoài

10 ml



XỊT CHỐNG XUẤT TINH SỚM



KHẸNG ĐỊNH PHÁI MẠNH

- ▶ **CHỨA LIDOCAIN 9,6%**
- ▶ **LÀM CHỦ CẢM XÚC, KÉO DÀI THỜI GIAN**
- ▶ **AN TOÀN, HIỆU QUẢ**
- ▶ **NHỎ GỌN, SANG TRỌNG**



THÀNH PHẦN:

Gynochthodes officinalis extract, Eurycoma longifolia extract, Lidocain 9,6% và phụ liệu vừa đủ 10ml.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Giúp hỗ trợ điều trị tình trạng xuất tinh sớm do hưng phấn nhanh quá mức ở nam giới trưởng thành có tình trạng cương cứng bình thường.

ỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Nam giới trên 18 tuổi cương cứng bình thường nhưng hưng phấn quá mức dẫn đến xuất tinh sớm.

CÁCH DÙNG:

Xịt trực tiếp lên đầu dương vật 3 đến 5 nhát, xoa cho thấm đều xung quanh để 5 phút mới bắt đầu quan hệ tình dục. Có thể đeo bao cao su.

Thiết bị y tế loại B



VP-PHARM
Health & Future

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Y

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài




VK - PRO



TĂNG CƯỜNG ĐỘ TRƠN, ĐỘ ẨM

CÔNG THỨC MƯỢT MÀ, LÀM THĂNG HOA CẢM XÚC



Dạng Gel dịu nhẹ,
mượt mà



KHÔNG MÙI, SIÊU BÔI TRƠN



QUAN HỆ DỄ DÀNG, MANG LẠI CẢM
GIÁC CỰC KHOÁI TRONG QHTD



AN TOÀN, KHÔNG GÂY TÁC
DỤNG PHỤ VÀ CẢM GIÁC KHÓ CHỊU

THÀNH PHẦN:

Purified water, Glycerine, Hydroxyethyl Cellulose, Acid lactic, Chlorhexidine Digluconate, Sodium methylparaben, Allantoin, Natri hydroxyd.

CÔNG DỤNG:

Tăng cường độ trơn, độ ẩm âm đạo, dưỡng vật và sinh lý tự nhiên, tạo cảm giác mượt mà .

ỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Sản phẩm dùng được cho cả nam và nữ trên 18 tuổi cần: Cung cấp chất nhờn tự nhiên, giúp âm đạo và dưỡng vật trơn hơn.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

Thiết bị y tế loại A



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

* Email: lienhe@vp-pharm.vn

* Website: http://vp-pharm.vn

Sản xuất tại: Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

XOA BÓP GIẢM ĐAU



Daratex[✓]

TUÝP KEM 20G

▶ GIẢM ĐAU TỨC THÌ



▶ NÓNG LÂU, ỔN ĐỊNH, TÁC DỤNG NHANH

▶ MÙI THƠM THƯ GIẢN, DỄ CHỊU

- **THÀNH PHẦN:** Tinh dầu Quế, Tinh dầu Gừng, Capsicum Oleoresin, Camphor, Menthol, Methyl salicylate, Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-40 Stearate (and) Cetareth-20, Cetyl alcohol, Isopropyl Palmitate, Dimethicone, Xanthan, Purified water, Ethanol, Phenoxyethanol, Disodium Edetate.
- **CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem trong tờ HSDS
- **MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:** Hỗ trợ điều trị giảm đau, chống viêm trong các trường hợp viêm khớp, nhức mỏi tê bì chân tay, bong gân, chấn thương do lao động hoặc chơi thể thao, viêm đau do thoái hóa đốt sống cổ, vai gáy, thoái hóa đốt sống lưng.
- **ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:** Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn.
- **CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:** Mỗi lần dùng một lượng kem vừa đủ bôi lên vùng da cần sử dụng sau đó dùng tay massage khoảng 5-10 phút. Ngày 1 đến 3 lần.

Thiết bị y tế loại A



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối * Email: lienhe@vppharm.vn * Website: http://vppharm.vn

SẢN XUẤT TẠI: Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao ABIPHA

Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

THUỐC

PHONG TÊ THẤP HD NEW

VIÊN NANG CỨNG



Thuốc dùng cho các trường hợp:

- Đau thần kinh ngoại biên ●
- Đau thần kinh tọa ●
- Đau liên sườn, đau vai gáy ●
- Các khớp sưng đau, tê mỏi ●



■ THÀNH PHẦN: Cho 1 viên

Mã tiền chế...70mg, Quế chi.....40mg, Đương quy....70mg, Đỗ trọng...70mg, Ngưu tất...60mg, Độc hoạt ...80mg, Thương truật...80mg, Thổ phục linh....100mg. *Tá dược vừa đủ 1 viên nang*

■ DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.

■ **CHỈ ĐỊNH:** Thuốc được dùng cho các trường hợp: Đau thần kinh ngoại biên, thần kinh tọa, đau liên sườn, đau vai gáy... các khớp sưng đau, tê mỏi.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 5 tuổi.

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gặp táo bón, háo khát.

■ **QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:** Trong thành phần thuốc có mã tiền là dược liệu độc, mặc dù đã được chế biến giảm độc nhưng với liều dùng thì vẫn phải dùng theo liều hướng dẫn. Nếu sử dụng quá liều (trên 50 viên/ngày) có thể gây rối loạn tiêu hóa, rối loạn co bóp dạ dày... Cần thông báo với bác sĩ và đến sở y tế để điều trị khi có biểu hiện quá liều.

■ LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Uống sau bữa ăn.

- Người lớn: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1-2 viên. Tối đa không quá 50 viên/ngày.

- Trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên

■ **SỐ ĐKSP: VD-27694-17**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

Thuốc điều trị

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO CEBRATON - VP

Suy giảm trí nhớ,
Căng thẳng thần kinh,
Kém tập trung

Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.



■ THÀNH PHẦN: Cho 1 viên

Cao đình lăng.....150mg tương đương 1500mg

Đình lăng.

Cao Bạch quả:.....40mg

■ DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm.

■ **CHỈ ĐỊNH:** Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.

Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Điện thoại đặt hàng: 0975 498 284

* Email: lienhe@vp-pharm.vn

* Website: <http://vp-pharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài



THUỐC ĐIỀU TRỊ



ZINKAST

Montelukast 5mg

“ DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ
HEN PHẾ QUẢN MẠN TÍNH
Ở NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM ”

GIẢM TRIỆU CHỨNG
VIÊM MŨI DỊCH
CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM



HỘP 28 GÓI

1. THÀNH PHẦN:

Mỗi 1 gói có chứa :

- Hoạt chất: Montelukast.....5mg (dưới dạng Montelukast natri)
- Tá dược: Microcrystalline cellulose, aspartam, mannitol, colloidal anhydrous silica.

2. CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị bổ sung ở bệnh nhân hen từ nhẹ đến trung bình, cơn hen không được kiểm soát đầy đủ bằng corticoid dạng hít và chủ vận beta tác dụng ngắn.
- Điều trị thay thế để giảm liều corticoid cho bệnh nhân hen mạn tính nhẹ và không có tiền sử cơn hen cấp cần điều trị bằng corticoid đường uống và bệnh nhân không dùng được corticoid đường hít.
- Dự phòng hen, khó thở do tập thể dục quá sức, gắng sức.

3. CÁCH DÙNG:

Có thể trộn cùng với thức ăn hoặc hòa vào nước uống. Trước khi sử dụng gói thuốc phải còn nguyên vẹn. Sau khi mở, gói thuốc nên được sử dụng trong vòng 15 phút. Nếu đã trộn với thức ăn thì không giữ lại sử dụng lần sau.

4. LIỀU DÙNG:

Trẻ từ 6-14 tuổi sử dụng 1 gói/ ngày vào buổi tối. Nên dùng trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ. Không cần điều chỉnh liều trong nhóm tuổi này.

5. SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HÀ NAM

Cụm CN Hoàng Đông, Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam.

Email: info@hamedipharma.com

Website: <http://hamedipharma.com>



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM**

Điện thoại đặt hàng: 0975 498 284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

CHUYÊN NHIỆT MIỆNG

Chuyên gia chuyên trị các bệnh viêm nhiễm trong khoang miệng


**CÔNG THỨC ĐỘC ĐÁO DUY NHẤT
TẠI VIỆT NAM**

BÔI LÀ CÓ TÁC DỤNG LIỀN

**Gói lớn hơn - 1,5g
so với các loại khác trên thị trường**



ORA-ORAPLUS



NANO BẠC

CLOHEXIDIN

CURCUMIN

D-PANTHENOL



■ THÀNH PHẦN:

Nano Bạc, Chamomile, Allantonin, Curcumin, Chlorhexidine, Vitamin E, D-Panthenol, Menthol, dịch chiết rau má, dịch chiết Lô hội, dịch chiết Kim ngân, Triethanolamine, Carbomer, nước tinh khiết.

■ CÔNG DỤNG:

Gel bôi khoang miệng; Giúp: làm sạch khoang miệng, làm dịu mát miệng khi bị: nhiệt miệng, viêm lợi, viêm quanh răng..., khử mùi hôi, làm thơm miệng, góp phần hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng.

■ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Bôi một lượng nhỏ lên vùng bị tổn thương để tạo ra một lớp màng mỏng lên bề mặt. Ngày dùng 5 đến 6 lần.

■ ĐỐI TƯỢNG DÙNG:

Người bị rộp miệng, rộp lưỡi, rộp lợi. Viêm khoang miệng

Số ĐK: 8641/20-CBMP-HN

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Sản phẩm đăng kí mỹ phẩm



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM IVYPHARMA**
Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

GEL LÀM MỜ SẸO **10 gram**



Huryxucar

► Dịu nhẹ, thấm sâu, không nhờn dính.

► Công thức đột phá tăng hiệu quả làm mờ sẹo, tái tạo da mới.

► Dưỡng ẩm da, làm mềm da, cải thiện độ đàn hồi.



THÀNH PHẦN: Allium Cepa Bulb Extract, Niacinamide, Alantonin, Curcumin, Fuctus Chidii extract, Excoecaria Cochinchinensis Extract, Centella Asiatica Extract, Houttuynia Cordata Extract, Curcumin, Sorbeth 30, PPG-26-Butech-26, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Quaternium-73, Carbomer, Iodopropnyl butylcarbamate và DMDM hydantoin trong nước, Butylene glycol, Fragrance, Sodium hydroxide, Mucopolysaccharide(MPS)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: Gel bôi da; Giúp: dưỡng ẩm da, làm mềm da, làm mờ các vết sẹo, thâm do sẹo trên da, giúp cải thiện độ đàn hồi, cho làn da mềm mại, đều màu và khỏe mạnh hơn.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Dùng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên và tuổi dậy thì, người lớn bị sẹo để lại do vết cắt, mụn, chấn thương, mụn mủ, mụn trứng cá, mụn thâm. Giúp làm mờ sẹo mụn, làm sáng vết thâm mụn, làm giảm vết đỏ trên da sau khi lành mụn

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng



Sản phẩm đăng kí mỹ phẩm



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA**

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

GIẢI ĐỘC ĐƯỜNG RUỘT



HẤP PHỤ CHẤT ĐỘC TRONG ĐƯỜNG RUỘT

BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT KHỎI CÁC HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NGỘ ĐỘC THỨC ĂN, TIÊU CHẢY

■ THÀNH PHẦN:

Than hoạt tính.....	250mg
Chiết xuất gừng.....	20mg
Chiết xuất cam thảo.....	15mg
Chiết xuất chanh.....	10mg

Phụ liệu : Đường trắng, PVP K30, acid citric, natri saccharin, magnesi stearat, aerosil, HPMC, PEG 6000 vừa đủ 1 viên

■ CÔNG DỤNG

Hỗ trợ làm giảm hấp thu các chất có hại trong đường tiêu hóa, giúp cải thiện các triệu chứng trướng bụng, đầy hơi, khó tiêu.

■ TIÊU CHUẨN: TCCS

■ BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát.

■ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người bị đau bụng đầy hơi, khó tiêu, trướng bụng. Người dùng thuốc, hóa chất quá liều.

■ CÁCH DÙNG:

- Trẻ từ 1 tuổi – 5 tuổi: Ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên
- Trẻ từ 6 – 8 tuổi: Ngày 3- 4 lần, mỗi lần 1 viên
- Trẻ trên 8 tuổi và người lớn: Ngày 3 đến 4 lần, mỗi lần 1 -2 viên.

Lưu ý: Nhai viên trước khi nuốt.

KLTB viên: 750 mg ± 7,5%.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng thuốc cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối,

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

VIÊN ĐẶT TRỊ

TRI-EXTRA GOLD

Cao dẻ ngựa, Depanthenol, Chamomile, Kẽm oxiat, Vitamin E, Đơn lá đỏ, Keo ong, Clohexidin, Lidocain

CHẤM DỨT NỖI LO BỆNH TRỊ

Tác dụng ngay tức thì ●
Hiệu quả 100% ●



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Đặt tạm thời trong hậu môn giúp giảm các triệu chứng của bệnh trĩ như đi ngoài ra máu, viêm sưng, đau rát, khó đi ngoài, táo bón. Giúp thu nhỏ búi trĩ, nhanh liền da, phòng nhiễm trùng và biến chứng của bệnh trĩ.

Thiết bị y tế loại A

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên đặt:

Cao dẻ ngựa	20mg
Lidocain HCl	10mg
Clohexidine gluconate	2mg
Vitamin E	20mg
Depanthenol	50mg
Chamomile	50mg
Đơn lá đỏ	100mg
Kẽm oxide	5mg
Keo ong	10mg



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Điện thoại đặt hàng: 0975 498 284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe



Hỗ trợ giúp thư giãn, an thần
**GIÚP TRẺ DỄ NGỦ
NGỦ SÂU GIẤC**



✦ **Trẻ khó ngủ**

✦ **Quấy khóc về đêm**

✦ **Hay giật mình**

✦ **Ngủ không ngon giấc**

■ **THÀNH PHẦN CẤU TẠO:** Mỗi 10ml có chứa:

Inulin.....
100mg
Magnesi gluconate.....
80mg
Chamomile extract (Chiết xuất Cúc La mã).....
65mg
Iron III hydroxyd polymaltose
(Sắt III hydroxyd polymaltose).....
50mg
Citrus aurantifolia extract (Chiết xuất Chanh).....
22mg
Passiflora foetida extract (Chiết xuất Lạc tiên).....

15mg
Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B6).....
2mg
Thiamin nitrat (Vitamin B1).....
2mg
Vitamin B9.....
70mcg
Vitamin B12.....
10mcg

Phụ liều: tá được vừa đủ 10 ml.

■ **CÔNG DỤNG:** Hỗ trợ giúp thư giãn, an thần, giúp trẻ dễ ngủ, ngủ sâu giấc.

■ **ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:** Trẻ khó ngủ, hay giật mình, quấy khóc về đêm, ngủ không ngon giấc.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM**
Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

XỊT HỌNG

DỪNG CHO

ĐAU HỌNG, VIÊM HỌNG
HO KHAN, HO CÓ ĐỜM

30 ml

ANZ

BỘ 3 LIDOCAIN + CLOHEXIDINE + KEO ONG



Hỗ trợ điều trị ngắn hạn và giảm triệu chứng khó chịu khi bị viêm họng, đau họng, sưng đau họng, đờm đặc, khó nuốt do nói nhiều hoặc ho nhiều gây ra.

Ho khan, ho có đờm, ho do kích ứng

DÙNG ĐƯỢC TỪ 2 TUỔI TRỞ LÊN

■ **THÀNH PHẦN:** Chlorhexidine Digluconate, Lidocainhydrochlorid, Kéo ong, Chiết xuất Cúc Tím (Echinaceae Extract), Chiết xuất Kim Ngân Hoa, Chiết xuất Tỳ Bà Diệp, Chiết xuất Cát Cánh, Tinh dầu Gừng, Tinh dầu Tràm, Menthol, Xylitol, Polysorbat 20, Ethanol 96%, Acid benzoic, Mật ong, Acesulfam K, Natri saccharin, Potassium sorbat, Glycerine, Hương bạc hà, nước tinh khiết.

■ **MỨC ĐÍCH SD:** Hỗ trợ điều trị ngắn hạn và giảm triệu chứng khó chịu khi bị viêm họng, đau họng, sưng đau họng, đờm đặc, khó nuốt do nói nhiều hoặc ho nhiều gây ra.
Ho khan, ho có đờm, ho do kích ứng

■ **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Lắc trước khi dùng. Hướng đầu xịt vào họng và khoang miệng ấn mỗi lần 2 đến 3 nhát. Ngày 5 đến 6 lần tùy mức độ nặng nhẹ của triệu chứng

■ **ỐI TƯỢNG DÙNG:**

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi bị viêm họng, đau họng, ngứa họng, ho khan, ho có đờm, ho do thời tiết hay kích ứng.

SỐ ĐK: 22000284/PC.BA-HN

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông

tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.



Thiết bị y tế loại A



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

SẢN XUẤT TẠI: Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao ABIPHA

Điện thoại đặt hàng: 0975.498.284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

DỪNG DỊCH XỊT MŨI



15ml

CODI-TRIVINE

Xylometazoline hydrochloride

0,05%

VIÊM MŨI
DỊ ỨNG

CẢM CÚM,
CHẢY NƯỚC
MŨI

VIÊM
XOANG

▶ DỪNG CHO TRẺ TỪ 2 TUỔI

▶ GIẢM NHANH CÁC TRIỆU
CHỨNG NGẠT MŨI, NGỨA MŨI,
HẮT XÌ, CHẢY NƯỚC MŨI

▶ HIỆU QUẢ BỀN VỮNG

▶ KHÔNG GÂY KHÔ MŨI

▶ THAY THẾ TUYỆT VỜI
CHO OTRIVINE NGOẠI

THÀNH PHẦN:

Xylometazoline Hydrochloride , Sodium hyaluronate, D-Panthenol, Menthol, Cineol, Cu 2+, Zn 2+, Sorbitol, Nước tinh khiết.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Giúp làm giảm triệu chứng hắt hơi, giảm kích ứng và ngứa xoang mũi do dị ứng, thay đổi thời tiết ở người mắc viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm mũi họng.
- Giúp giảm nhanh các triệu chứng ngạt mũi, giảm tiết dịch xoang mũi, làm thông thoáng đường mũi xoang.

ỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người bị viêm xoang, viêm mũi cấp và mạn tính, viêm mũi họng.
- Người bị các chứng nghẹt mũi, sổ mũi mùa, cảm cúm.
- Dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

Thiết bị y tế loại A



VP-PHARM
Health & Future

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý

Điện thoại đặt hàng: 0975. 498. 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

Nước súc miệng



Daratex[✓]

» **CHỨA CHLORHEXIDINE 0.12%,
GIÚP SÁT KHUẨN, LÀM SẠCH SÂU MIỆNG
VÀ HỌNG**

» **CHỨA TINH DẦU, GIÚP HƠI THỞ THƠM MÁT**

» **THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG,
DÙNG ĐƯỢC CHO TRẺ TỪ 3 TUỔI**



/Chai 250 ml/

1. THÀNH PHẦN:

Chlorhexidin digluconat 0,12%, NaF (Na.Flouride)0,02%, Sodium saccharin, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 hydrogenated castor oil, Menthol, Acid citric, Methyl Salicylate, Tinh dầu Đinh hương, tinh dầu Hương nhu, Tinh dầu Bạc hà, nước tinh khiết vừa đủ.

2. CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ điều trị viêm nướu, hôi miệng, viêm răng miệng, nhiệt miệng. Giúp vệ sinh răng miệng và giữ hơi thở thơm mát hàng ngày. Phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm ở khoang răng miệng.

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Dùng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên để súc miệng hàng ngày hoặc sau khi ăn.

4. CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Dùng trực tiếp, lấy nắp đong trên đầu chai, rót một lượng vừa đủ vào nắp sau đó cho vào miệng, súc miệng trong khoảng 30 giây rồi nhổ đi.

6. BẢO QUẢN:

Đặt nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30 độ C.

7. HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất, xem trên bao bì.

8. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: TCCS

9. SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG (TNHH)

Địa chỉ: T5509, TBD 01, cụm CN Hạp Linh, P.Hạp Linh, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thiết bị y tế loại A



VP-PHARM
Health & Future

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối, sản phẩm được sản xuất tại nhà máy dược phẩm GMP-WHO

Khu công nghiệp Hoàng Đông, tỉnh Hà Nam * Email: lienhe@vppharm.vn * Website: http://vppharm.vn

Điện thoại đặt hàng: 0975 498 284

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

Xịt mũi xoang

/Chai thủy tinh 20ml/

Daratex

**KHÔNG CẦN DÙNG KHÁNG SINH,
KHÔNG CORTICOID.**



TÁC DỤNG BỀN VỮNG, VƯỢT SỰ MONG ĐỢI.



DÙNG CHO

- » **VIÊM MŨI DỊ ỨNG, VIÊM XOANG,
VIÊM NGŪA MŨI**
- » **CHẢY NƯỚC MŨI, CẢM CÚM, HẮT XÌ**
- » **DÙNG ĐƯỢC CHO TRẺ TỪ 6 TUỔI**

1. THÀNH PHẦN: Chlorhexidine digluconate, Benzalkonium chloride, Kim ngân hoa, Kinh giới, Mã đề, Ngủ sắc, Ké đầu ngựa, Đơn lá đỏ, Xà sàng tử, Potassium sorbate, Nước tinh khiết.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Hỗ trợ làm giảm viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm ngứa mũi, chảy nước mũi, cảm cúm, hắt xì hơi.

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Dùng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm ngứa mũi, chảy nước mũi, cảm cúm, hắt xì hơi

4. CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Hướng đầu xịt vào mũi, ấn dứt khoảng 2 đến 3 hạt cho sản phẩm đi sâu vào trong. Áp dụng đối với cả hai bên mũi đến khi hết hẳn triệu chứng

5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

6. BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 độ C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Để xa tầm tay của trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

7. HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất, xem trên bao bì.

8. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: TCCS

9. SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA.

Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
SĐT: 024 62 62 77 88

Thiết bị y tế loại A



VP-PHARM
Health & Future

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM độc quyền phân phối
Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA**
Điện thoại đặt hàng: 0975 498 284

* Email: lienhe@vppharm.vn

* Website: <http://vppharm.vn>

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM

Trụ sở: Số 213 Lô C5 KĐT M Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VPGD: Lô B1.2-LK4-12 - KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội

Điện thoại : 0975.498.284 * Email: lienhe@vppharm.vn

Cuốn tài liệu này chỉ dùng để đào tạo nội bộ VP-PHARM, không phân phát ra bên ngoài