

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA VNR88 (BẢN FULL)

I. Đặc tính giống

VNR88 là giống lúa thuần cảm ôn nên gieo cấy được các vụ trong năm. Giống có năng suất cao, chất lượng tốt (hạt gạo trắng trong, cơm trắng, mềm, dẻo, ngon).

Thời gian sinh trưởng:

- **Khu vực Bắc Bộ:** Vụ Xuân 125 - 135 ngày; vụ Mùa 105 - 110 ngày (gieo sạ rút ngắn 5 - 7 ngày).
- **Khu vực Bắc Trung Bộ:** Ngắn hơn khu vực Bắc Bộ khoảng 3 - 5 ngày.
- **Khu vực Nam Trung Bộ:** Vụ Đông Xuân 115 - 125 ngày; vụ Hè Thu 105 - 110 ngày (gieo sạ rút ngắn 5 - 7 ngày).

Đặc điểm hình thái, khả năng chống chịu: Chiều cao cây 100 - 118 cm, phiến lá phẳng đứng, gọn khóm, màu xanh đậm. Chống đổ tốt, chịu thâm canh, chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính, thích ứng rộng.

Năng suất: Năng suất cao, thâm canh tốt có thể đạt 7,5 - 8,0 tấn/ha.

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Mật độ gieo trồng:

- **Mật độ cấy:** Vụ Đông Xuân/Xuân 40 - 45 khóm/m²; Vụ Hè Thu/Mùa khoảng 40 khóm/m²; cấy 2 - 3 dảnh/khóm.
- **Sạ giống:** 40 - 50 kg/ha đối với các tỉnh miền Bắc; 80 - 100 kg/ha đối với các tỉnh miền Trung và miền Nam.

2. Phân bón:

- Nên ưu tiên sử dụng các loại phân bón NPK chuyên dùng cho lúa hoặc các loại phân bón có hàm lượng dinh dưỡng cân đối. Lựa chọn chủng loại phân bón và điều chỉnh lượng bón phù hợp với điều kiện đất đai, mùa vụ, trình độ thâm canh và khả năng sinh trưởng của cây lúa.
- Bón phân đầy đủ, cân đối và đúng thời điểm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất ghi trên bao bì sản phẩm, kết hợp với khuyến cáo của cơ quan chuyên môn tại địa phương. Hạn chế bón thừa đạm, tăng cường kali và các chất trung, vi lượng khi cần thiết nhằm giúp cây sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ ngã, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng hạt.

3. Phòng trừ dịch hại: Thường xuyên kiểm tra ruộng để phát hiện sớm và phòng trừ dịch hại kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan BVTV địa phương. Có thể tham khảo sử dụng một số loại thuốc đặc trị như sau: Michelle 62EC (Trừ cỏ tiền nảy mầm), Blastogan 75WP (Đạo ôn), Xantocin 40WP (Bạc lá, đốm sọc vi khuẩn), Pexena 20WG, Opal 50WG (Rầy), Solo 350SC, Virtako 40WG (Sâu cuốn lá).

4. Thu hoạch: Thu hoạch khi lúa chín khoảng 85 - 90%, sấy theo quy trình kỹ thuật. Nếu phơi nắng, nên phơi dưới nắng nhẹ, không phơi quá mỏng và tránh nắng gắt để duy trì hương thơm và chất lượng hạt giống.

Thông tin cảnh báo an toàn: Bố trí thời vụ thích hợp để đảm bảo khi lúa trổ bông nhiệt độ không khí từ $20^{\circ}\text{C} \leq t^{\circ} \leq 36^{\circ}\text{C}$, độ ẩm không khí không thấp hơn 70%, ruộng lúa phải đảm bảo đủ nước; Che phủ nilon đúng cách để chống rét cho mạ. Không dùng hạt lúa thương phẩm (lúa thối) để làm giống.

Hướng dẫn này chỉ có tính chất tham khảo, có thể điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thời tiết, đất đai và tập quán canh tác của từng địa phương.