

サブシジョン・TCAの説明書

この用紙では上記の施術について説明します。不明な点は医師、またはスタッフに確認してください。
お伝えする内容、記載された内容は一般的なもので個人差があります。

▶▶安全に施術を受けていただくために



既往歴、現病歴、手術歴、使用中・服用中のお薬について、妊娠・出産・授乳について、アレルギー・その他お体で心配なことについて事前に申告してください。申告がない場合、当院では一切の責任を負いかねます。また、施術部位の近くに異物が入っている方は、合併症が起こりやすく、施術をお勧めしません。何らかの合併症が起きた場合にも、当院では責任を負いかねます。

【当てはまる項目はありますか？】 ※該当があれば申告してください。

禁忌 <該当する方はお受けいただけません>

☐ 妊娠中・産後3ヶ月以内(3ヶ月以内の中絶・流産含む) ☐ がん(悪性腫瘍の未治療～治療中)

☐ タトゥー/アートメイク(部位:)

※Skin52(色素改善)の場合、施術範囲及びその周囲についてレーザー治療を受けられなくなる可能性があります

要注意 <該当する方はお受けいただけない場合があります>

☐ 授乳中 ☐ 心疾患 ☐ 自己免疫疾患 ☐ 膠原病 ☐ 糖尿病 ☐ てんかん ☐ アトピー ☐ ケロイド体質

☐ ヘルペス(部位:)

☐ 施術部位の手術2ヶ月以内 ☐ 施術部位の2週間以内の注射

☐ 知覚障害(部位:) ☐ 感染症()

☐ 現病歴() ☐ 既往歴()

☐ 内服・外用薬() ☐ 薬物アレルギー()

☐ レチノール配合化粧品 ☐ ハイドロキノン配合化粧品 ☐ 3日以内のワクチン接種

▶▶サブシジョンとは？

ニキビ跡の凹凸の改善を目的とした治療です。

にきび跡の癒着している部分を針で剥離し、下から引っ張っている力を解除します。

下から引っ張られている力が解除されると、自然の創傷治癒の力が促進され、傷が盛り上がり、なだらかになることが期待できます。

▶▶TCAクロスとは？

高濃度トリクロロ酢酸(TCA)を患部に塗布することで、創傷治癒の働きによりニキビ跡のへこみにアプローチする施術です。創傷治癒の過程においてコラーゲンやエラスチンといった成分が作られやすくなり、ニキビ跡のへこみが目立ちにくくなる効果を期待できます。

▶▶施術日まで

- ・乾燥している肌へ負担となりますので、十分に保湿してください。

▶▶施術当日の注意点

- ・医療行為に伴う使用物品などで衣類が汚れてしまう場合がございますので、汚れてもよい服装でご来院ください。
- ・来院時間に遅れた場合は、施術部位の制限、処置をお断りする事があります。
- ・酒気を帯びている場合施術をお断りすることがあります。
- ・貴金属・貴重品は持参しないでください。
- ・ご持参いただいた薬剤(麻酔など)の使用はできません。
- ・施術中に担当医・看護師以外のスタッフが入室することがあります。
- ・メイクを落としていただきます。

麻酔

- ・サブシジョンのみ: 局所麻酔(+医師の指示がある場合麻酔クリーム)
- ・TCAのみ: 麻酔クリーム
- ・サブシジョン+TCA: 麻酔クリーム+局所麻酔
 - こんな副作用が起きることがあります。(だるさ・熱感・頭痛・咳・蕁麻疹・痒み・むくみ・冷や汗・胸痛・動悸・アナフィラキシーショック・呼吸困難など)

▶▶予約について

- ・施術について、事前にLINE、電話、メールまたはクリニックにて予約をお取りください。
(ご希望者が多い施術は予約が取りにくいことがあります。)
- ・医療行為を行っているため、予約時間どおりにご案内できないことがあります。
- ・予約時間に遅れた場合、施術を行えないことがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- ・使用機器の故障や不具合により、やむを得ず予約の変更をお願いすることがあります。
- ・天災地変により臨時休業となる場合は、当院より予約のお客様へ電話やメール等でご連絡をさせていただいております。
 なお、天災地変による臨時休業の場合、変更・キャンセル料は発生いたしません。
- ・天災地変(地震、台風、津波等)、火災、停電、テロ、重大な疾病その他不可抗力の事由によって臨時休業となり、
 予約を変更・キャンセルした場合、患者様に生じた以下の損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
 ア 宿泊費(宿泊費の変更キャンセル料を含みます)、交通費
 イ 施術予定日にかかる休業損害

▶▶施術後の一般的な経過

- 一時的な肌の白み、カサツタ、赤み、色素沈着、瘢痕、ヒリヒリ感
- 注射針による内出血、発赤、腫れ、痛みを生じる事があります。内出血は1～2週間続くことがあります。
赤みや色素沈着がある場合は3～6か月程かけて薄くなります。(1年かかる方もいます。)

▶▶このような症状が起きることがあります

※施術後に以下の症状もしくは施術に起因すると考えられる症状がみられ、
医師が治療を必要と判断した場合、治療の必要性を説明、同意のうえ適切な治療を行います。

- 稀にアレルギー・感染・痺れ・倦怠感・頭痛・蕁麻疹・痒み・むくみ・発熱・咳・冷や汗・胸痛・アナフィラキシーショック・呼吸困難・知覚鈍麻・色素沈着、色素脱失、硬結、ニキビが大きくなったと感じる、などを生じることがあります。
- 万が一、症状が生じた際は当院へご連絡ください。

施術後、何か気になることやご心配なことがありましたら、当院へご連絡ください。
当院での施術部位について、他院でご相談や施術を受けた場合、当該部位について当院で対応することが出来なくなることがあります。

▶▶アフターケア

- ・頭を高くして寝ると浮腫みを抑えられます
- ・酒・タバコは浮腫みや腫れ、傷の治りの遅れとなるため、施術後1週間はお控えください。
- ・施術部位は、こすったり刺激しない様注意してください。

洗顔フォームメイク落とし	サブシジョン: 医師指示あり TCA: 3日目～ (2日目まで生理食塩水で洗う)	化粧水・乳液	3日目～ (生理食塩水の洗浄期間終了後)
メイク	洗顔フォーム使用可能時期～	シャワー	当日から可
入浴	1週間後	施術部位のマッサージ	1ヶ月後から可

▶▶処方(処方箋がです)

- 生理食塩水(NaCl) 0.9%
- 軟膏: Tyrosur 1日2～3回塗布 3日間(サブシジョン部位のみ)
- クリーム: Rejuvaskin 3日目～1日2回塗布 次回来院まで